



POpolazione Sieropositiva ITaliana

Abitudini e stili di vita della popolazione sieropositiva italiana

Survey
realizzata da



In collaborazione
con



Con il supporto
non condizionato di



INTRODUZIONE

L'attuale esigenza di personalizzare la terapia ARV sul singolo paziente, supportata anche dalla sempre più ampia disponibilità di farmaci in commercio, ha portato alla necessità di condurre un'analisi sulle persone con infezione da HIV in Italia. Lo scopo di tale iniziativa è quello di cercare di individuare quali fossero le peculiarità del paziente HIV+, in termini di caratteristiche socio-demografiche, comportamentali e psichiche.

METODOLOGIA

Progetto POSIT – POpolazione Sieropositiva ITaliana – indagine socio-epidemiologica ideata e curata da *Edge Consulting* nel rispetto e nell'osservanza dei codici standard di operato redatti da ESOMAR (*European Society for Opinion and Market Research*), con il supporto scientifico della Fondazione Nadir Onlus.

L'indagine è stata effettuata nel mese di giugno 2007, coinvolgendo un **panel di 30 infettivologi**, afferenti ai principali centri italiani di Malattie Infettive, nella compilazione di un questionario anonimo costituito da **38 domande**. I quesiti prevedevano risposte *multiple choice*, ossia "chiuse".

Sulla base dei risultati ottenuti attraverso la compilazione di **890 schede**, *Edge Consulting* ha fornito uno spaccato delle abitudini e degli stili di vita della persona affetta da infezione da HIV di oggi.

Per raccogliere tali informazioni, il questionario è stato centrato sulle seguenti tematiche:

Dati generali

Dati generali (nazionalità, sesso, stato civile, livello di istruzione, professione, ...)

Stile di vita

Stile di vita (viaggi, frequentazione discoteche, ...)

Cura della persona


Cura della persona (attività sportiva, utilizzo di altri farmaci, ...)

Profilo psicologico

Profilo psicologico (stabilità psicologica, supporto di parenti e amici, ...)


Una sintesi della survey

Nazionalità




Base: 890 pazienti

Sesso



Base: 883 pazienti


Preferenze sessuali



Base: 890 pazienti


Età del paziente

Età media: 43,6 anni




Base: 890 pazienti

Coinfezioni




Base: 890 pazienti

Stato civile




Base: 890 pazienti

Figli




Base: 890 pazienti

Livello di istruzione




Base: 890 pazienti

Livello di informazione rispetto ai fatti del mondo




Base: 890 pazienti

Professione



Base: 890 pazienti


Frequenza viaggi



Base: 890 pazienti


Stile di vita

Abitudini alimentari




Base: 844 pazienti

Frequentazione ristoranti




Base: 890 pazienti

Frequentazione discoteche




Base: 890 pazienti

Fumatore




Base: 890 pazienti

Uso di sostanze stupefacenti




Base: 890 pazienti

Attività sportiva




Base: 890 pazienti

Utilizzo di altri farmaci




Base: 890 pazienti

Utilizzo di altre sostanze




Base: 890 pazienti

Sieropositività nota a famiglia o partner




Base: 890 pazienti

Livello di conoscenza della patologia




Base: 890 pazienti

Livello di accettazione della malattia




Base: 890 pazienti

Supporto di parenti e amici




Base: 890 pazienti

Stabilità psicologica



Base: 890 pazienti

Autosospensione della terapia



Base: 890 pazienti

