

POSIT

POpolazione Sieropositiva ITaliana

Abitudini e stili di vita del paziente che svolge attività manuali

Rilevazione 2007
Rilevazione 2008

New

Survey
realizzata da



In collaborazione
con



Con il supporto
non condizionato di



Metodologia

- Progetto POSIT – POpolazione Sieropositiva Italiana – è un'indagine socio-epidemiologica ideata e curata da *Edge Consulting* nel rispetto e nell'osservanza dei codici standard di operato redatti da ESOMAR (*European Society for Opinion and Market Research*), con il supporto scientifico della Fondazione Nadir Onlus
- L'indagine ha avuto due rilevazioni svolte nel 2007 e nel 2008
- Tempo di rilevazione dei dati in ciascuna wave: un mese
- Panel coinvolto: 30 infettivologi, afferenti ai principali centri italiani di Malattie Infettive
- Dati raccolti mediante compilazione di un questionario anonimo
- Quesiti strutturati con risposte *multiple choice*, ossia "chiuse"
- Variabili prese in esame:
 - demografiche
 - epidemiologiche
 - fattori di rischio
 - patologie concomitanti
 - utilizzo di altri farmaci non ARV
 - stile di vita
 - cura della persona
 - percezione del medico inerente il profilo psicologico del paziente

I dati ottenuti dalla compilazione delle schede hanno permesso di fornire uno spaccato delle abitudini e degli stili di vita della persona con infezione HIV di oggi in Italia.

Metodologia 2008 – Le novità

- Rilevazione dei dati: aprile 2008
- Raccolti 1210 questionari, 320 in più rispetto al 2007
- 14 nuove domande, per un totale di 36 quesiti
- L'inserimento del dato relativo all'anno di diagnosi del paziente ha permesso di confrontare abitudini e stili di vita di persone HIV+ con diagnosi effettuata tra il 2004 e il 2008, rispetto a quelle con diagnosi precedente il 2004. Tali dati saranno oggetto di apposite pubblicazioni, una relativa alla popolazione totale del campione in studio e una per ciascun profilo predominante emerso dall'indagine

Come leggere il leaflet

I dati di questo leaflet presentano quanto emerso dalle due rilevazioni svolte nel 2007 e nel 2008.


Ciascun grafico riporta:

- il dato complessivo della popolazione in studio raccolto nel 2008
- il dato del profilo raccolto nel 2007
- il dato del profilo raccolto nel 2008.

Legenda

Il simbolo  indica un nuovo quesito posto nella rilevazione 2008.


La frase "I dati sono stati rilevati con domande differenti nei due anni di indagine", indica che il dato raccolto nel 2007 è stato rielaborato, poiché nella rilevazione del 2008 la domanda è stata posta in modo lievemente differente.



Una sintesi della survey




Situazione lavorativa




I dati sono stati rilevati con domande differenti nei due anni di indagine

Sesso




Orientamento sessuale




I dati sono stati rilevati con domande differenti nei due anni di indagine

Nazionalità




I dati sono stati rilevati con domande differenti nei due anni di indagine

Età




I dati sono stati rilevati con domande differenti nei due anni di indagine

Stato civile




I dati sono stati rilevati con domande differenti nei due anni di indagine

Vive da solo




New

Caratteristiche del partner




New

Figli




I dati sono stati rilevati con domande differenti nei due anni di indagine


Gravidanza




Gravidanza pianificata



Desiderio di gravidanza




Livello di istruzione




I dati sono stati rilevati con domande differenti nei due anni di indagine

Coinfezioni da HBV e/o HCV




I dati sono stati rilevati con domande differenti nei due anni di indagine


Frequenza viaggi



Frequentazione locali




Alimentazione




I dati sono stati rilevati con domande differenti nei due anni di indagine

Pasti fuori orario




Fumatore




I dati sono stati rilevati con domande differenti nei due anni di indagine

Uso di alcol




Uso di sostanze stupefacenti




I dati sono stati rilevati con domande differenti nei due anni di indagine

Attività sportiva




I dati sono stati rilevati con domande differenti nei due anni di indagine

Altri farmaci utilizzati




New

Livello di conoscenza della malattia




Accettazione della malattia




I dati sono stati rilevati con domande differenti nei due anni di indagine

Sieropositività nota a famiglia o partner




Supporto psicologico




I dati sono stati rilevati con domande differenti nei due anni di indagine


Si sente depresso?



Si sente ansioso?



Stabilità psicologica



I dati sono stati rilevati con domande differenti nei due anni di indagine

Autosospensione della terapia

