

# 2021 FARMACI CONTRO L'HIV

## TERAPIE COMPLETE

DA ASSUMERE  
TUTTI I GIORNI<sup>1</sup>

### CON 3 O PIÙ FARMACI

**Biktarvy**<sup>®</sup> (TAF + FTC + BIC)  
**Delstrigo**<sup>®</sup> (TDF + 3TC + DOR)  
**Eviplera**<sup>®</sup> (TDF + FTC + RPV)<sup>2</sup>  
**Genvoya**<sup>®</sup> (TAF + FTC + EVG + COBI)<sup>2</sup>

**Odefsey**<sup>®</sup> (TAF + FTC + RPV)<sup>2</sup>  
**Stribild**<sup>®</sup> (TDF + FTC + EVG + COBI)<sup>2</sup>  
**Symtuza**<sup>®</sup> (TAF + FTC + DRV + COBI)  
**Triumeq**<sup>®</sup> (ABC + 3TC + DTG)

### CON 2 FARMACI

**Juluca**<sup>®</sup> (DTG + RPV)<sup>2</sup>

**Dovato**<sup>®</sup> (DTG + 3TC)

A LUNGA DURATA  
DI AZIONE (LA)

**Vocabria**<sup>®</sup> + **Rekambys**<sup>®</sup> cabotegravir iniettabile + rilpivirina iniettabile (CAB LA + RPV LA)<sup>4</sup>

## FARMACI DA ASSOCIARE

NUCLEOSI(TI)DICI

### SINGOLI

**Emtriva**<sup>®</sup>, emtricitabina (FTC)<sup>5</sup>  
**Epivir**<sup>®</sup>, lamivudina (3TC)<sup>5</sup>  
**Viread**<sup>®</sup>, tenofovir disoproxil fumarato (TDF)<sup>5</sup>  
**Ziagen**<sup>®</sup>, abacavir (ABC)<sup>5</sup>

### COMBINATI

**Descovy**<sup>®</sup>, tenofovir alafenamide + emtricitabina (TAF+FTC)  
**Kivexa**<sup>®</sup>, abacavir + lamivudina (ABC+3TC)<sup>5</sup>  
**Truvada**<sup>®</sup>, tenofovir disoproxil fumarato + emtricitabina (TDF+FTC)<sup>5</sup>

NON NUCLEOSIDICI

**Edurant**<sup>®</sup>, rilpivirina (RPV)<sup>2</sup> **Pifeltro**<sup>®</sup>, doravirina (DOR) **Rekambys**<sup>®</sup>, rilpivirina iniettabile (RPV LA)

INIBITORI DELLA PROTEASI

### CON POTENZIATORE

**Prezista**<sup>®</sup>, darunavir (DRV)

**Rezolsta**<sup>®</sup>, darunavir + cobicistat (DRV + COBI)<sup>2</sup>  
**Evotaz**<sup>®</sup>, atazanavir + cobicistat (ATV + COBI)<sup>2</sup>

INIBITORI DELL'INTEGRASI

**Isentress**<sup>®</sup>, raltegravir (RAL)<sup>6</sup> **Tivicay**<sup>®</sup>, dolutegravir (DTG)  
**Vocabria**<sup>®</sup>, cabotegravir orale (CAB)<sup>4</sup>, cabotegravir iniettabile (CAB LA)<sup>3,4</sup>

ATTACHMENT INHIBITOR

**Rukobia**<sup>®</sup>, fostemsavir (FTR)<sup>4,7</sup>

ANTICORPI MONOCLONALI

**Trogarzo**<sup>®</sup>, ibalizumab (IBA)<sup>4,7,8</sup>

FARMACI PER CASI  
PARTICOLARI O  
NON PIÙ IN USO

**tipranavir** (TPV), **maraviroc** (MVC), **indinavir** (IDV), **enfuvirtide** (ENF), **etravirina**, (ETR), **saquinavir** (SQV), **ritonavir**, **zidovudina** (AZT), **efavirenz** (EFV), **fosamprenavir** (FPV), **nelfinavir** (NFV), **didanosina** (Ddi), **nevirapina** (NVP), **stavudina** (d4t), **Combivir**<sup>®</sup> (AZT + 3TC), **lopinavir/r** (LPV/r)

TERAPIE COMPLETE USATE  
IN CASI PARTICOLARI

**Atripla**<sup>®</sup> (TDF+FTC+EFV), **Trizivir**<sup>®</sup> (AZT+3TC+ABC)

### LEGENDA

- 1 Una compressa, una volta al giorno
- 2 Da assumere con cibo
- 3 Due iniezioni intramuscolari ogni 2 mesi
- 4 In corso di valutazione dalle autorità regolatorie
- 5 Vi sono farmaci bioequivalenti (generici)
- 6 In una o due somministrazioni al giorno
- 7 Per pazienti fortemente pre-trattati
- 8 Per endovena ogni due settimane

### NOTE

- Per alcuni medicinali vi sono formulazioni o dosaggi differenti da assumere con diverse posologie a seconda del paziente e/o di altre patologie
- Alcuni principi attivi (BIC, EVG) compaiono solo in co-formulazioni.
- Cobicistat (COBI) è solo potenziatore di farmacocinetica (booster).
- Riferirsi al foglietto illustrativo (scheda tecnica) e alle indicazioni del medico curante in merito a: posologia, dosaggi, combinazioni di medicinali, raccomandazioni dietetiche e/o metaboliche, tossicità, coinfezioni, interazioni con altre terapie, complicanze, compromissione epatica e/o renale, gravidanza.
- Eventuali aggiornamenti e necessità di sintesi possono comportare variazioni.